ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева"
Минздрава России
Адрес место нахождения и почтовый адрес:
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1
Тел.: (495) 287-65-70

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное учреждение
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России)

27 АВГ 2026 № 8/N

Москва

Президенту благотворительного фонда «Русфонд»
Л.С. Амбиндеру

Уважаемый Лев Сергеевич!

Просим Вас оказать помощь в приобретении лекарственных препаратов для пациента, проходящего лечение в отделении онкогематологии.

ФИО пациента: Бибик Олег Максимович

Дата рождения: 11.01.2017

Диагноз: C83.7 - Лимфома Беркитта [Burkitt] (Лимфома Беркитта с поражением надключичных, внутригрудных л/у, плевры, забрюшинного пространства и брюшной полости, с инфильтрацией стенок тонкого кишечника, л/у в поддиафрагмальном пространстве с 2х сторон, печени. 3 стадия, 3 группа риска. t(8;14)(q24;q32) MYC::IGH, прогрессия от 30.04.26г. CAR-T (анти CD19) в дозе 487 х 10*3/кг от16.07.26., 590 х 10*3/кг от 31.07.26., ауто-ТГСК в дозе 15 х 10*6/кг от 16.07.26.)

Протокол лечения: B-NHL-2021

Медикамент: Колумви (МНН: Глофитамаб), Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10мг, №1

Форма выпуска: конц. для р-ра д/инф.

Кол-во упаковок: 4

Схема приема: 2 неделя - 10мг, 3 неделя - 30 мг

Суточная дозировка: 2 неделя - 10мг, 3 неделя - 30 мг

Медицинское обоснование: У пациента с диагнозом: Лимфома Беркитта с

поражением надключичных, внутригрудных л/у, плевры, забрюшинного пространства и брюшной полости, с инфильтрацией стенок тонкого кишечника, л/у в поддиафрагмальном пространстве с 2х сторон, печени. 3 стадия, 3 группа риска. t(8;14)(q24;q32) MYC::IGH, прогрессия от 30.04.26г. CAR-T (анти CD19) в дозе 487 х 10*3/кг от16.07.26., 590 х 10*3/кг от 31.07.26., ауто-ТГСК в дозе 15 х 10*6/кг от 16.07.26 по данным контрольного обследования после проведенной аутологичной ТГСК с аутологичными CAR-T-клетками сохраняется ПЭТ-позиивная остаточная опухоль. В качестве консолидации показано проведение курса Глофитамаба.

Вес пациента 36,5 кг, рост 140,5 см.

Данный препарат в НМИЦ ДГОИ отсутствует.

Лечащий врач Романенко Е.С.